

ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีและอายุการเก็บรักษาของผลตะลิงปลิง
Effect of temperature on physical and chemical quality and shelf life of bilimbi
(*Averrhoa bilimbi L.*) Fruit

อดิศักดิ์ จูมวงศ์¹
Adisak Joomwong¹

Abstract

The effect of temperature on quality and shelf life of bilimbi was studied. Bilimbi fruit were packed on foam trays which were then wrapped with PVC film and stored at 0, 5 and 25 °C. Stored fruit were evaluated on physical and chemical parameters. The results showed that the percentage of weight loss was increased in fruit stored at all temperatures. The temperature at 5 °C caused the least weight loss of fruit. The fruit firmness and L* value of fruit peel were decreased as storage proceeded whereas a*, b*, chroma and h° values tended to increase during storage. TSS, Carotenoids, chlorophyll a, chlorophyll b, citric acid, malic acid, tartaric acid and vitamin C contents have trends of decrease during storage. On the other hand, pH was increased in fruit stored at all temperature. The postharvest shelf life of bilimbi fruit stored at 5 °C was 8 days.

Keywords: Bilimbi (*Averrhoa bilimbi L.*), storage, quality, physical property, chemical property

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาตะลิงปลิง โดยนำผลตะลิงปลิงมาบรรจุในถาดโฟมที่หุ้มด้วยพลาสติกใส PVC เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0, 5 และ 25 องศาเซลเซียส ทำการวัดค่าทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีพบว่า ผลมีการสูญเสียน้ำหนัก(ร้อยละ)เพิ่มขึ้นในทุกอุณหภูมิการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสผลมีการสูญเสียน้ำหนัก(ร้อยละ)น้อยที่สุด ความแน่นเนื้อและความสว่างของผล (L*) มีค่าลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนค่า a*, b*, chroma, h° มีค่าเพิ่มขึ้นทุกอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ (TSS) บริมาณแคลอรีที่น้อยลง คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี กรดซิตริก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริก และวิตามินซีมีค่าลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนค่า pH มีค่าเพิ่มขึ้น การเก็บรักษาผลตะลิงปลิงที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได้นาน 8 วัน
คำสำคัญ: ตะลิงปลิง การเก็บรักษา คุณภาพ คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี

คำนำ

ตะลิงปลิง (*Averrhoa bilimbi L.*) เป็นพืชในวงศ์ Averrhoaceae มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ bilimbi, bilimbing, cucumber Tree เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในอินโด네เซีย มาเลเซีย ที่นำมายุกในประเทศไทยแล้ว ตะลิงปลิงเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5 – 10 เมตร มีใบประกอบแบบขนนก จำนวน 11 - 37 ใบ ในย่อยรูปหอก ปลายใบแหลม โคนมน ใบกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2 - 5 เซนติเมตร สีเขียวมีขดลวด ดอกตะลิงปลิงออกเป็นช่อคล้ายเชือก ตามลำต้นหรือกิ่ง ช่อดอกสั้น ๆ มีความยาวไม่เกิน 13 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดงเข้ม ติดผลตามลำต้นและกิ่งก้านเป็นพวงแน่น (สุอาทิพย์, 2551) ผลมีรสเปรี้ยว การบริโภคผลย่อนโดยประทานกับกะปิ น้ำปลาหวาน เกลือ หรือส้มตำตะลิงปลิง หรือใช้เป็นเครื่องปุงอาหาร เช่น แกงส้ม แกงเหลือง และยำต่างๆ หรือน้ำดันตะลิงปลิง (ฤทธิ์, 2547) ส่วนการแปรรูปมีการดอง หรือแช่หิม สำหรับการศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวกับผลตะลิงปลิงนั้นมีจำนวนจำกัด จึงสนใจวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของผลตะลิงปลิง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผลตะลิงปลิง รวมถึงการแนวทางในการแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลตะลิงปลิง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลตะลิงปลิง ในอนาคต

¹ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
¹ Division of Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, 50290, Thailand

อุปกรณ์และวิธีการ

เก็บผลตะลิงปลิงแก่เชีย อายุ 60 วันหลังตอกบานจากสวนเกษตรกรในอำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 นำมาคัดแยกผลที่มีลักษณะผลกลมยาวปลายมน ผิวเรียบ ผลมีสีเขียว และไม่มีตำหนิ มาใช้ด้วยผ้าสะอาด นำมาติดฉลากหมายเลขผลตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบ โดยการนำผลที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน 10 ผล บรรจุในถุงโพลีฟลัฟฟ์ฟิล์ม (PVC) นำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 5 และ 25 องศาเซลเซียส และตรวจคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีทุกวัน การศึกษาสมบัติทางกายภาพด้านการสูญเสียน้ำหนักผล คิดเป็นร้อยละของการสูญเสียน้ำหนัก โดยใช้สูตร

$$\text{ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก} = \frac{(\text{น้ำหนักผลเริ่มต้น} - \text{น้ำหนักผล ณ วันทดสอบ})}{\text{น้ำหนักผลเริ่มต้น}} \times 100$$

การวัดสีผลด้วยเครื่องวัดสี (Color Reader) ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น CR-10 ค่าที่ได้จะแสดงออกมาเป็น ค่าความสีว่างของสี (L^*) ค่าสีเขียว (a^*) ค่าสีเหลือง (b^*) ค่า chroma และค่า hue angle การวัดความแน่นเนื้อ (Firmness) ด้วยเครื่องวัดความแน่นเนื้อ (Fruit Hardness Tester) รุ่น FHR-1 หัวเจาะแบบ Hemisphere ขนาด 12 mm. โดยกดหัวเจาะลงในเนื้อผลบริเวณกลางผล

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีน้ำดันของผลตะลิงปลิงแต่ละผล น้ำดันค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ (TSS, Total soluble solids) ด้วย Digital Refractometer Atago model PR-101 แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์บริกซ์ วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Sartorius Professional Meter PP-50 ปริมาณกรดที่ให้ทั้งหมด (Titratable acidity, TA) โดยการไฟเทอร์น้ำดันกับสารละลายด่างมาตรฐานและคำนวนผลในรูปกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริก แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (AOAC methods 942.15, 2000) หาปริมาณวิตามินซีโดยการไฟเทอร์น้ำดันด้วย 2,6-dichlorophenol-indophenol (AOAC methods 967.21, 2000) หาปริมาณรงค์วัตตุ (แคนโนทินอยด์, คลอโรฟิลล์) ด้วยเครื่องวัดปริมาณการวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 420, 447, 654 และ 663 นาโนเมตร

ผลการทดลองและวิจารณ์

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของผลตะลิงปลิง พบว่า มีค่าการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้นในทุกอุณหภูมิตั้งแต่วันแรกของการเก็บรักษา โดยที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสมีค่าการสูญเสียน้ำหนักมากที่สุด รองลงมาคือ 25 และ 5 องศาเซลเซียส (Figure 1 a) การสูญเสียน้ำหนักของผลไม้ส่วนใหญ่เกิดจากการคายน้ำภายในผลหลังการเก็บเกี่ยว ในผลตะลิงปลิงที่มีน้ำเป็นประกอบประมาณร้อยละ 95 (อดีศักดิ์, 2554) จึงทำให้มีการสูญเสียน้ำหนักผลเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา สดคล้องกับรายงานของ Souza และคณะ (2009) ที่ระบุผลการเก็บรักษาผลตะลิงปลิงในถุงโพลีฟลัฟฟ์ฟิล์ม (PVC) และเก็บที่ 10 ± 1 องศาเซลเซียสจะมีการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้น ค่าความแน่นเนื้อมีค่าลดลงในทุกอุณหภูมิของการเก็บรักษา โดยเฉพาะที่ 0 และ 25 องศาเซลเซียสมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วและมีค่าต่ำกว่าที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส (Figure 1 b) โดยทั่วไปความแน่นเนื้อของผลไม้จะลดลงระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีริวิทยาและทางชีวเคมี ซึ่งมีเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์สารประกอบที่เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ผลไม้ ทำให้เกิดการแตกตัวของสารประกอบเพคตินที่ไม่ละลายน้ำ โดยมีเอนไซม์โพลีกาแลคตูรอนาส (Polygalacturonase) และเบตา-กาแลคโตซิಡase (β-galactosidase) เกิดเป็นสารละลายเปคตินที่ละลายน้ำ ซึ่งพบมากที่มิติดلامเล็มลา (Middle lamella) เป็นเหตุให้โครงสร้างของผนังเซลล์แตกตัวทำให้เนื้อผลไม้น้ำลง (King and Bolin, 1989)

การวัดค่าสีผลพบว่า ค่า a^* (ค่าสีเขียว-แดง) มีค่าเพิ่มขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาคือมีการเปลี่ยนสีจากเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อน (Figure 1 c) ซึ่งสดคล้องกับปริมาณคลอโรฟิลล์อี และคลอโรฟิลล์บีมีค่าลดลงในทุกอุณหภูมิของการเก็บรักษา (Data not show) ค่าความสีว่าง (L^*) มีลดลงในทุกอุณหภูมิของการเก็บรักษา แสดงว่าผลตะลิงปลิงมีสีคล้ำขึ้น ค่า b^* (ค่าสีน้ำเงิน-เหลือง) มีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าผลมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น (Data not show)

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำมีค่าลดลงทุกอุณหภูมิของการเก็บรักษา โดยเฉพาะที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่าผลตะลิงปลิงมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำลดลงในวันที่ 2 ของการเก็บรักษา (Figure 1 d) ค่าพีเอชมีค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าความเป็นกรดลดลง ซึ่งสดคล้องกับปริมาณเปอร์เซ็นต์ของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกที่ลดลง (Figure 1 e) ปริมาณวิตามินซีมีค่าลดลงทุกอุณหภูมิและระยะเวลาของการเก็บรักษา (Figure 1 f) โดยเฉพาะที่ 25 องศาเซลเซียส มีค่าต่ำ

ที่สุด เนื่องจากการได้รับอุณหภูมิสูงจะทำให้ผลิตะลิงปลิงจะมีการสูญเสียวิตามินซีเพิ่มขึ้น คล้ายกับผลสัมจะสูญเสียวิตามินซี กรณีที่เก็บในอุณหภูมิสูงมีค่ามากกว่าเก็บในอุณหภูมิต่ำ (Seung and Kader, 2000)

สรุป

ผลิตะลิงปลิงในทุกอุณหภูมิการเก็บรักษามีการสูญเสียน้ำหนัก ค่า a^* (เขียว-แดง) ค่า b^* (น้ำเงิน-เหลือง) และค่าที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนค่าความแน่นเนื้อผล ค่าความสว่างของผล (L^*) ปริมาณของแพ็คที่ละลายได้ในน้ำ ปริมาณกรดที่ให้เหตุได้ (กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดթาร์ทาริก) ปริมาณวิตามินซี คลอร์ฟิลล์เอ และคลอร์ฟิลล์บี มีค่าลดลงในทุกอุณหภูมิของการเก็บรักษา ผลิตะลิงปลิงที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 8 วัน

เอกสารอ้างอิง

- ศูนย์พิพิธภัณฑ์ 2551 ตะลิงปลิง. นิตยสารหม道ชาวบ้าน. ปีที่ 30 ฉบับ 352. หน้า 18-20.
- อดิศักดิ์ จุนวงศ์. 2554. การศึกษาลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของผลิตะลิงปลิง. เรื่องเด่นภาคบรรยายคำดับที่ 38 ภาคประชุม วิชาการหุ่นยนต์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 1-5.
- ถุไร จิรังคลาการ. 2547. ผักพื้นบ้าน สำนักพิมพ์บ้านและสวน กรุงเทพฯ. 224 หน้า
- King, A. D. and H. R. Bolin. 1989. Physiological and microbiological storage stability of minimally processed fruits and vegetables. *Food Technology*, 43: 132-135.
- Official Methods of AOAC International. 2000. 17th Ed. AOAC International, Gaithersburg, MD, USA, Official Method 942.15.
- Official Methods of AOAC International. 2000. 17th Ed. AOAC International, Gaithersburg, MD, USA, Official Method 967.21.
- Seung, K. L and A. A. Kader. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. *Postharvest Biology and Technology* 20: 207-220.
- Souza, P.A.D., G.G.D. Silva, P.L.D.D. Morais, E.C.D. Santos, E.M.M. Aroucha and J.B. Menezes. 2009. Revista Brasileira De Fruticultura 31(4): 1190- 1195.




Figure 1 Change of physical and chemical properties of bilimbi at storage time.